

IPRIKENE®
Diosmectita
Polvo
3 g
Para suspensión

¿Para qué se utiliza IPRIKENE?

IPRIKENE es un auxiliar en el tratamiento sintomático de la diarrea aguda en adultos, niños e infantes (mayores de 1 mes) en conjunto con terapia de hidratación.

¿Cómo utilizar IPRIKENE?

Modo de empleo:

El contenido de cada sobre debe ser diluido en 50 mL de agua para ser administrado vía oral en una sola toma, o bien mezclado con alimentos semilíquidos tales como: caldo, papilla, puré, alimento para bebe, verduras molidas, etc

Dosis y tiempo de uso

Grupo de edad	Dosis/días
Lactante menor o infante: 1 a 12 meses.	2 sobres por día durante 3 días
Lactante mayor y preescolares: de 1 a 4 años	4 sobres por día durante 3 días
Escolares: de 5 a 9 años	4 sobres por día durante 3 días
Adolescentes: de 10 a 19 años	2 sobres 3 veces al día durante 4 días

Adultos y Adultos mayores: de 20 años en adelante 3 a 6 sobres al día durante 4 días

Contraindicaciones.

No use IPRIKENE en caso de:

- Hipersensibilidad (alergia) a la diosmectita o alguno de los componentes, de la fórmula.
- Diarrea severa que se acompaña de moco, pus y/o sangre o fiebre mayor de 39°C.
- Obstrucción intestinal o ausencia de movimiento en el intestino, especialmente adultos mayores.

Precauciones generales.

IPRIKENE debe ser usado cuidadosamente en los siguientes casos:

- En niños y bebés la diarrea debe ser tratada en asociación con la administración temprana de una solución de rehidratación oral para evitar la deshidratación.
- En personas que presenten riesgo de deshidratación (por ejemplo, en personas de edad avanzada) el tratamiento también debe acompañarse de rehidratación oral.
- Se debe mantener la ingesta de alimentos durante el episodio de diarrea.

Precauciones o restricciones de uso durante el embarazo o la lactancia

Su uso durante el embarazo solo puede ser recomendado por el médico.