

IPRIKENE®

Diosmectita

Suspensión

3 g

¿Qué es Diosmectita 3g suspensión oral en sobre y para qué se usa?

Diosmectita es una arcilla natural purificada que cubre la mucosa digestiva.

Diosmectita está indicado en el tratamiento de la diarrea aguda en niños mayores de 2 años además de rehidratación oral y en adultos.

Dosis:

Tratamiento de diarrea aguda:

En niños de 2 años de edad: 4 sobres por día por 3 días, después 2 sobres por día por 4 días.

En adultos: en promedio, 3 sobres por día por 7 días. En la práctica, la dosis diaria puede ser doble al inicio del tratamiento.

Uso y vía de administración:

Vía oral.

La suspensión es mezclada mediante el amasado del sobre entre los dedos antes de abrirlo.

El contenido del sobre puede ser tragado sin diluir o mezclado en un poco de agua antes de beberla.

En niños, el contenido del sobre puede ser mezclado con un poco de agua en un biberón, o mezclado con un producto alimenticio semilíquido : cereal, fruta estofada o en puré, frasco de comida de bebé, etc.

Preferiblemente tomar en diferente tiempo de los alimentos.

¿Qué necesita saber antes de tomar Diosmectita 3g, suspensión oral en sobre?

Nunca tomar Diosmectita 3g, suspensión oral en sobre:

- Si es alérgico a Diosmectita o a cualquier otro componente de este medicamento.

- No deberá tomar Diosmectita 3g, suspensión oral en menores de 2 años.
- No se recomienda para uso prolongado.

En niños con diarrea aguda

En niños, Diosmectita debe usarse junto con una solución de rehidratación oral (Suero Oral) para reemplazar los líquidos perdidos debido a la diarrea y para prevenir la deshidratación.

La ingesta de alimentos debe mantenerse en los niños mientras persista la diarrea. Se recomiendan comidas pequeñas y frecuentes de alimentos mixtos (por ejemplo, arroz, huevos, carnes, algunas frutas y verduras cocidas).

Si el niño experimenta cambios en el comportamiento, si los síntomas de diarrea no mejoran o empeoran o si hay vómitos frecuentes o persistentes, llame a su médico.

En adultos con diarrea aguda, Diosmectita es un tratamiento complementario a la rehidratación con agua, para reemplazar los líquidos perdidos debido a la diarrea. Se debe mantener la ingesta de alimentos mientras persiste la diarrea. Se recomiendan comidas ligeras pequeñas, excluyendo alimentos grasos, pesados, picantes, estimulantes o jugos de frutas.

El tratamiento de la diarrea en pacientes ancianos o frágiles requiere cuidados especiales, ya que la diarrea puede provocar una pérdida significativa de líquidos (deshidratación) que puede tener consecuencias graves.

Diarrea crónica y dolor abdominal

No se recomienda el uso prolongado o repetido de Diosmectita. En casos de diarrea crónica o dolor abdominal, si los síntomas persisten durante más de dos semanas, consulte a su médico para que se puedan investigar las causas antes de continuar su tratamiento.

Embarazo y lactancia:

Diosmectita no es recomendada durante el embarazo y lactancia.

Si está embarazada o lactando, sospecha que está embarazada o planea tener un bebé, solicite a su médico consejo antes de tomar este medicamento.